

MATEMÁTICAS II

Selectividad 2023

Comunidad autónoma de

MURCIA



www.apuntesmareaverde.org.es

Autor: Universidad de Murcia. Luis J. Alías Linares

Coordinador Matemáticas II

ebaumatematicas.com



	EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) FASE GENERAL CURSO: 2022–2023 MATERIA: MATEMÁTICAS II	CONVOCATORIA: ORDINARIA DE JUNIO
---	--	---



OBSERVACIONES IMPORTANTES: Se debe responder a un máximo de 4 cuestiones y no es necesario hacerlo en el mismo orden en que están enunciadas. Si se responde a más de 4 cuestiones, sólo se corregirán las 4 primeras, en el orden que haya respondido el estudiante. Solo se podrán usar las tablas estadísticas que se adjuntan. No se podrán usar calculadoras gráficas ni programables.

Tiempo máximo: 1 hora y 30 minutos.

Bloque 1: Números y Álgebra (2,5 puntos cada una)

Cuestión 1.

Una papelería vende bolígrafos, rotuladores y libretas. Una libreta cuesta el doble que un bolígrafo y un rotulador juntos, un bolígrafo cuesta la sexta parte que una libreta, y un rotulador cuesta el doble que un bolígrafo.

- a) (0,75 p.) Denotando por x el precio de cada bolígrafo, por y el de cada rotulador y por z el de cada libreta, plantee un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que represente los datos del ejercicio.
- b) (0,25 p.) Justifique que, con estos datos, no se puede conocer el precio de cada uno de los tres productos.
- c) (1 p.) Calcule el conjunto de todas las posibles soluciones del sistema.
- d) (0,5 p.) Sabiendo que una libreta cuesta 18 euros, calcule el precio de cada producto.

Cuestión 2.

Considere las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & a \\ -1 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) (0,5 p.) Determine para qué valores del parámetro a la matriz A es regular (o invertible).

Se sabe que cuando $a = -2$ la matriz A es regular (o invertible). Para ese valor de a :

- b) (1 p.) Calcule la inversa de A y compruebe que $A \cdot A^{-1} = I$, con I la matriz identidad de orden 2.
- c) (1 p.) Resuelva la ecuación matricial $AXA^{-1} + B = C^T$, donde C^T denota la matriz traspuesta de C .

Bloque 2: Cuestiones 3 y 4. Análisis (2,5 puntos cada una)**Cuestión 3.**

Calcule los siguientes límites:

a) (1,25 p.) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x \operatorname{sen}(x)}$.

b) (1,25 p.) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x}$.

Cuestión 4.

Considere la función $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$.

a) (0,5 p.) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) (0,5 p.) Calcule la derivada de $f(x)$ y determine los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento de la función $f(x)$.

c) (1 p.) Calcule la integral indefinida de la función $f(x)$.

d) (0,5 p.) Determine la primitiva de $f(x)$ que pasa por el punto (1, 1).

Bloque 3: Cuestiones 5 y 6. Geometría (2,5 puntos cada una)**Cuestión 5.**

Considere las siguientes rectas:

$$r : \begin{cases} x - 2y = 5 \\ y + z = 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad s : \frac{x-8}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-3}{-1}.$$

- (1 p.) Compruebe que ambas rectas son paralelas.
- (1 p.) Compruebe que el punto $P = (7, 1, -1)$ está en la recta r y calcule su proyección ortogonal sobre la recta s .
- (0,5 p.) Calcule la distancia entre ambas rectas.

Cuestión 6.

Considere el plano π de ecuación $\pi : 3x - y - 2z = 5$ y la recta r dada por

$$r : \frac{x-a}{1} = \frac{y-3+a}{1} = \frac{z}{1}.$$

- (1,25 p.) Estudie la posición relativa del plano π y de la recta r en función del parámetro a .

Se sabe que cuando $a = 0$ la recta r es paralela al plano π . Para ese valor de a :

- (0,75 p.) Calcule la distancia de la recta r al plano π .
- (0,5 p.) Calcule la ecuación general (o implícita) del plano que contiene a la recta r y es paralelo al plano π .

*Cuestiones 7 y 8. Estadística y Probabilidad (2,5 puntos cada una)***Cuestión 7.**

Dos urnas A y B contienen bolas de colores con la siguiente composición: La urna A contiene 3 bolas verdes, 3 bolas rojas y 4 bolas negras, y la urna B contiene 1 bola verde, 3 bolas rojas y 5 bolas negras. Se saca al azar una bola de la urna A y se mete en la urna B. A continuación, se saca al azar una bola de la urna B. Calcule:

- (0,5 p.) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra, sabiendo que la bola que se sacó de la urna A era verde.
- (1 p.) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra.
- (1 p.) La probabilidad de que la bola que se sacó de la urna A fuera verde, sabiendo que la bola que se ha sacado de la urna B ha sido negra.

Cuestión 8.

En este ejercicio trabaje con 4 decimales para las probabilidades. Se lanza una moneda al aire 100 veces y se anota el resultado del lanzamiento, que puede ser cara o cruz con la misma probabilidad. Determine:

- (0,5 p.) Qué distribución sigue la variable aleatoria que cuenta el número de veces que sale cara.
- (0,5 p.) Calcule la media y la desviación típica de esta distribución.
- (0,5 p.)Cuál es la probabilidad de que salga cara 60 veces.
- (1 p.)Cuál es la probabilidad de que el número de veces que sale cara sea mayor o igual que 55.

RESPUESTAS CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO

Bloque 1: Números y Álgebra (2,5 puntos cada una)

Cuestión 1.

Una papelería vende bolígrafos, rotuladores y libretas. Una libreta cuesta el doble que un bolígrafo y un rotulador juntos, un bolígrafo cuesta la sexta parte que una libreta, y un rotulador cuesta el doble que un bolígrafo.

- (0,75 p.) Denotando por x el precio de cada bolígrafo, por y el de cada rotulador y por z el de cada libreta, plantee un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que represente los datos del ejercicio.
- (0,25 p.) Justifique que, con estos datos, no se puede conocer el precio de cada uno de los tres productos.
- (1 p.) Calcule el conjunto de todas las posibles soluciones del sistema.
- (0,5 p.) Sabiendo que una libreta cuesta 18 euros, calcule el precio de cada producto.

Solución

Solución: a) Se trata de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, en donde las incógnitas son el precio unitario de cada uno de los productos. Denotemos por x el precio de cada bolígrafo, por y el precio de cada rotulador y por z el precio de cada libreta. El primer dato del ejercicio es que "una libreta cuesta el doble que un bolígrafo y un rotulador juntos", que da lugar a la primera ecuación:

$$z = 2(x + y) \iff 2x + 2y - z = 0.$$

El segundo dato del ejercicio es que "un bolígrafo cuesta la sexta parte que una libreta", que da lugar a la segunda ecuación:

$$x = \frac{z}{6} \iff 6x - z = 0.$$

El tercer dato del ejercicio es que "un rotulador cuesta el doble que un bolígrafo", que da lugar a la tercera ecuación:

$$y = 2x \iff 2x - y = 0.$$

Por lo tanto, hay que resolver el siguiente sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 0 \\ 6x - z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

b) Como se puede observar, se trata de un sistema de ecuaciones homogéneo, que es siempre un sistema compatible ya que, al ser la última columna de $A^* = (A|b)$ una columna de ceros, siempre se tiene que $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^*)$. En este caso se tiene

$$A^* = (A|b) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 0 \\ 6 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

A tiene al menos un menor de orden 2 distinto de cero, $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, y su determinante es

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 6 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 6 - 4 - 2 = 0.$$

Por lo tanto, $\text{rango}(A) = \text{rango}(A^*) = 2 < 3$ y se trata de un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones dependientes de un parámetro. Por lo tanto, con los datos de que se dispone no es posible conocer el precio de cada uno de los productos.

c) El sistema se puede resolver en función de un parámetro. Por ejemplo, eligiendo como parámetro $x = \lambda$ y desechando la primera ecuación, queda el sistema

$$\begin{cases} 6\lambda - z = 0 \\ 2\lambda - y = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} z = 6\lambda \\ y = 2\lambda \end{cases}$$

cuya solución es

$$x = \lambda, \quad y = 2\lambda \quad y \quad z = 6\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

d) Sabiendo que $z = 6\lambda = 18$ euros (precio de cada libreta) se concluye que $x = \lambda = 3$ euros (precio de cada bolígrafo) y que $y = 6$ euros (precio de cada rotulador).

Cuestión 2.

Considere las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & a \\ -1 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) (0,5 p.) Determine para qué valores del parámetro a la matriz A es regular (o invertible).

Se sabe que cuando $a = -2$ la matriz A es regular (o invertible). Para ese valor de a :

- b) (1 p.) Calcule la inversa de A y compruebe que $A \cdot A^{-1} = I$, con I la matriz identidad de orden 2.
- c) (1 p.) Resuelva la ecuación matricial $AXA^{-1} + B = C^T$, donde C^T denota la matriz traspuesta de C .

Solución

Solución: a) Sabemos que A es regular si y sólo si $|A| \neq 0$. En este caso se tiene $|A| = a^2 + a = a(a+1)$. Por lo tanto

$$A \text{ no es regular} \iff |A| = a(a+1) = 0 \iff a = 0 \text{ o } a = -1$$

o, equivalentemente,

$$A \text{ es regular} \iff |A| = a(a+1) \neq 0 \iff a \neq 0 \text{ y } a \neq -1.$$

Es decir, A es regular para todo valor de a distinto de 0 y de -1 .

b) Como $a = -2$ se tiene

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad |A| = 4 - 2 = 2 \neq 0.$$

Podemos calcular la inversa de A por cualquiera de los métodos válidos. Por ejemplo, utilizando la fórmula

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A^T) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Comprobamos que efectivamente se tiene $A \cdot A^{-1} = I$:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-1 & -2+2 \\ 1-1 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) Despejando X en la ecuación matricial se tiene

$$AXA^{-1} + B = C^T \Rightarrow AXA^{-1} = C^T - B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot (C^T - B) \cdot A.$$

Calculamos entonces

$$C^T - B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -8 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -8 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -14 & -2 \\ 11 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 30 & 32 \\ -23 & -24 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Bloque 2: Cuestiones 3 y 4. Análisis (2,5 puntos cada una)

Cuestión 3.

Calcule los siguientes límites:

a) (1,25 p.) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x \operatorname{sen}(x)}$.

b) (1,25 p.) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x}$.

Solución

Solución: a) Comenzamos calculando

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x \operatorname{sen}(x)} = \frac{\cos(0) - 1}{0 \cdot \operatorname{sen}(0)} = \frac{1 - 1}{0 \cdot 0} = \frac{0}{0}.$$

Podemos resolver esta indeterminación aplicando la regla de L'Hôpital y se tiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x \operatorname{sen}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{sen}(x) + x \cos(x)} = \frac{-2 \operatorname{sen}(0)}{\operatorname{sen}(0) + 0 \cos(0)} = \frac{-2 \cdot 0}{0 + 0 \cdot 1} = \frac{0}{0}.$$

Aplicamos de nuevo la regla de L'Hôpital y se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{sen}(x) + x \cos(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \cos(2x)}{\cos(x) + \cos(x) - x \operatorname{sen}(x)} \\ &= \frac{-4 \cos(0)}{\cos(0) + \cos(0) - 0 \cdot \operatorname{sen}(0)} \\ &= \frac{-4}{1 + 1 - 0} = \frac{-4}{2} = -2. \end{aligned}$$

En resumen

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{x \operatorname{sen}(x)} = -2.$$

b) En primer lugar observamos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x} = \frac{\sqrt{9} - \sqrt{9}}{0} = \frac{0}{0}.$$

Un modo sencillo de resolver esta indeterminación es operando algebraicamente:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x} &= \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x} \cdot \frac{\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x}}{\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x}} \\ &= \frac{(\sqrt{9+x})^2 - (\sqrt{9-x})^2}{3x(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x})} = \frac{9+x - (9-x)}{3x(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x})} \\ &= \frac{9+x-9+x}{3x(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x})} = \frac{2x}{3x(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x})} \\ &= \frac{2}{3(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x})}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3(\sqrt{9+x} + \sqrt{9-x})} = \frac{2}{3(\sqrt{9} + \sqrt{9})} = \frac{2}{3(3+3)} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}.$$

Para los incondicionales de L'Hôpital, la indeterminación inicial también se puede resolver por el método de L'Hôpital, haciendo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{9+x}} - \frac{-1}{2\sqrt{9-x}}}{3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{9+x}} + \frac{1}{2\sqrt{9-x}}}{3} \\ &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{9}} + \frac{1}{2\sqrt{9}}}{3} = \frac{\frac{1}{\sqrt{9}}}{3} = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Cuestión 4.

Considere la función $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$.

- (0,5 p.) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- (0,5 p.) Calcule la derivada de $f(x)$ y determine los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento de la función $f(x)$.
- (1 p.) Calcule la integral indefinida de la función $f(x)$.
- (0,5 p.) Determine la primitiva de $f(x)$ que pasa por el punto $(1, 1)$.

Solución

Solución: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = \frac{+\infty}{+\infty}$. Para resolver esta indeterminación podemos operar algebraicamente, observando que

$$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{1+x^2}{x^2}} = \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1}.$$

De este modo,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{+\infty} + 1} = \frac{1}{0+1} = 1.$$

También se puede razonar por la regla de los grados. En este caso, como el numerador y el denominador son ambos polinomios de grado 2, se tiene

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = \frac{1}{1} = 1.$$

b) La derivada de $f(x)$ viene dada por

$$f'(x) = \frac{2x \cdot (1+x^2) - x^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2x + 2x^3 - 2x^3}{(1+x^2)^2} = \frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

Para determinar los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento de la función $f(x)$, calculamos primero los puntos críticos de $f(x)$, es decir, las soluciones de la ecuación $f'(x) = 0$:

$$f'(x) = 0 \iff 2x = 0 \iff x = 0.$$

A continuación, estudiamos el signo de $f'(x)$ para ver dónde la función es creciente o decreciente. Como $f'(x) = 0$ solo para $x = 0$, basta con darle valores a $f'(x)$ a la izquierda y a la derecha de este valor. Además, el denominador de $f'(x)$ es siempre positivo, por lo que el signo de $f'(x)$ solo depende del signo del numerador. Observamos que $f'(x) > 0 \iff x > 0$ y que $f'(x) < 0 \iff x < 0$, de modo que $f(x)$ es creciente en el intervalo $(0, +\infty)$ y decreciente en el intervalo $(-\infty, 0)$.

c) Se trata de una integral racional casi elemental. Operando algebraicamente se tiene

$$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{x^2+1-1}{1+x^2} = \frac{x^2+1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}.$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \operatorname{arc\,tg} x + C.$$

d) Por el apartado c) sabemos que la primitiva general de $f(x)$ es $F(x) = x - \operatorname{arc\,tg} x + C$. Se trata, por tanto, de calcular el valor de C para que $F(1) = 1$. En este caso

$$F(1) = 1 - \operatorname{arc\,tg} 1 + C = 1 - \frac{\pi}{4} + C = 1 \iff C = \frac{\pi}{4}.$$

La solución es $F(x) = x - \operatorname{arc\,tg} x + \frac{\pi}{4}$.

Bloque 3: Cuestiones 5 y 6. Geometría (2,5 puntos cada una)

Cuestión 5.

Considere las siguientes rectas:

$$r : \begin{cases} x - 2y = 5 \\ y + z = 0 \end{cases} \quad y \quad s : \frac{x-8}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-3}{-1}.$$

- (1 p.) Compruebe que ambas rectas son paralelas.
- (1 p.) Compruebe que el punto $P = (7, 1, -1)$ está en la recta r y calcule su proyección ortogonal sobre la recta s .
- (0,5 p.) Calcule la distancia entre ambas rectas.

Solución

Solución: a) El vector director de la recta r viene dado por

$$\vec{v}_r = (1, -2, 0) \times (0, 1, 1) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k} = (-2, -1, 1).$$

Además, el vector director de la recta s es $\vec{v}_s = (2, 1, -1)$. Como ambos vectores son paralelos, significa que las rectas r y s o bien son paralelas o bien son coincidentes. El punto $Q = (8, -3, 3)$ está en s pero no está en r , ya que no cumple la primera de las ecuaciones de r ($8 + 6 \neq 5$), por lo que se trata de dos rectas paralelas.

Otra forma de resolver este apartado es pasar la recta s a su forma implícita y estudiar el sistema de ecuaciones resultante de las dos rectas. Es ese caso, la recta s se escribe como

$$s : \frac{x-8}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-3}{-1} \implies s : \begin{cases} x - 2y = 14 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

y el sistema de ecuaciones resultante es el siguiente sistema de cuatro ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ y + z = 0 \\ x - 2y = 14 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

La matriz del sistema es

$$A^* = (A|b) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

En este caso es muy fácil ver que se trata de un sistema incompatible (la primera y la tercera ecuación son incompatibles). Además, $\text{rango}(A) = 2$ y $\text{rango}(A^*) = 3$, ya que A tiene solo 2 filas linealmente independientes pero A^* tiene algún menor de orden 3 distinto de 0, por ejemplo,

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 14 \end{vmatrix} = 14 - 5 = 9 \neq 0.$$

Esto significa que las rectas son paralelas.

b) El punto $P = (7, 1, -1)$ está en la recta r porque cumple sus dos ecuaciones:

$$r : \begin{cases} x - 2y = 7 - 2 = 5 \\ y + z = 1 - 1 = 0 \end{cases} \implies P \in r.$$

La proyección ortogonal de P sobre s se puede calcular como intersección de la recta s con el plano π perpendicular a s que pasa por P . Vamos entonces a calcular este plano π . Como el vector director de s es $\vec{v}_s = (2, 1, -1)$, el haz de planos perpendiculares a s viene dado por $2x + y - z + D = 0$, con $D \in \mathbb{R}$. Calculamos el valor de D para que π pase por P :

$$P \in \pi \iff 2 \cdot 7 + 1 - (-1) + D = 0 \iff 16 + D = 0 \iff D = -16.$$

Por tanto, $\pi : 2x + y - z = 16$. Como la recta s es $s : \begin{cases} x - 2y = 14 \\ y + z = 0 \end{cases}$, la proyección ortogonal de P sobre s viene dado como la solución del siguiente sistema, que por interpretación geométrica es S.C.D. (no es necesario comprobarlo):

$$\begin{cases} 2x + y - z = 16 \\ x - 2y = 14 \\ y + z = 0 \end{cases} \implies A^* = (A|b) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 16 \\ 1 & -2 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \text{ con } |A| = -6.$$

La solución es

$$x = \frac{1}{-6} \begin{vmatrix} 16 & 1 & -1 \\ 14 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-60}{-6} = 10,$$

$$y = \frac{1}{-6} \begin{vmatrix} 2 & 16 & -1 \\ 1 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{12}{-6} = -2,$$

$$z = \frac{1}{-6} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 16 \\ 1 & -2 & 14 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{-12}{-6} = 2.$$

En conclusión, la proyección ortogonal de P sobre s es el punto $Q = (10, -2, 2)$.

c) La distancia entre ambas rectas se puede calcular directamente como la distancia entre los puntos P y Q del apartado anterior:

$$d(r, s) = d(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{9+9+9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3},$$

ya que $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = (10, -2, 2) - (7, 1, -1) = (3, -3, 3)$.

Otra forma de calcular la distancia entre ambas rectas es utilizar que

$$d(r, s) = d(P, s) = \frac{|\vec{v}_s \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{v}_s|}$$

siendo P un punto cualquier de la recta r y A un punto cualquiera de la recta s . Podemos tomar $P = (7, 1, -1)$ que, por el enunciado, sabemos que está en la recta r y $A = (8, -3, 3)$, con $\vec{v}_s = (2, 1, -1)$. En ese caso, $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = (7, 1, -1) - (8, -3, 3) = (-1, 4, -4)$ y

$$\vec{v}_s \times \overrightarrow{AP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 4 & -4 \end{vmatrix} = -4\vec{i} + \vec{j} + 8\vec{k} + 4\vec{i} + 8\vec{j} + \vec{k} = (0, 9, 9).$$

Por tanto,

$$d(r, s) = d(P, s) = \frac{|\vec{v}_s \times \overrightarrow{AP}|}{|\vec{v}_s|} = \frac{\sqrt{81+81}}{\sqrt{4+1+1}} = \frac{9\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}.$$

Cuestión 6.

Considere el plano π de ecuación $\pi : 3x - y - 2z = 5$ y la recta r dada por

$$r : \frac{x - a}{1} = \frac{y - 3 + a}{1} = \frac{z}{1}.$$

- a) (1,25 p.) Estudie la posición relativa del plano π y de la recta r en función del parámetro a .

Se sabe que cuando $a = 0$ la recta r es paralela al plano π . Para ese valor de a :

- b) (0,75 p.) Calcule la distancia de la recta r al plano π .
- c) (0,5 p.) Calcule la ecuación general (o implícita) del plano que contiene a la recta r y es paralelo al plano π .

Solución:

Solución: a) Lo más sencillo es pasar la recta r a su forma implícita, considerar el sistema de ecuaciones formado por la ecuación del plano π y las ecuaciones implícitas de la recta r y estudiar dicho sistema en función del parámetro a . Para ello, observamos que

$$r : \frac{x - a}{1} = \frac{y - 3 + a}{1} = \frac{z}{1} \Rightarrow r : \begin{cases} x - z = a \\ y - z = 3 - a \end{cases}$$

y el sistema de ecuaciones resultante es el siguiente:

$$\begin{cases} 3x - y - 2z = 5 \\ x - z = a \\ y - z = 3 - a \end{cases}$$

La matriz del sistema es

$$A^* = (A|b) \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 1 & -1 & 3 - a \end{array} \right).$$

El determinante de A es $|A| = -2 + 3 - 1 = 0$ y como A tiene al menos un menor de orden 2 distinto de cero, por ejemplo $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$ sabemos que $\text{rango}(A) = 2$ para todo valor de a .

Para estudiar el rango de A^* basta estudiar el rango de la submatriz

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 3 - 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 3 - a \end{vmatrix} = 5 - 3a + 3 - a = 8 - 4a = 0 \Leftrightarrow a = 2.$$

Por tanto, si $a \neq 2$ se tiene $\text{rango}(A^*) = 3 > 2 = \text{rango}(A)$ y se trata de un sistema incompatible, sin solución. Geométricamente significa que la recta r no corta al plano π y por tanto la recta es paralela al plano.

Si $a = 2$ se tiene $\text{rango}(A^*) = 2 = \text{rango}(A) < n = 3$ y se trata de un sistema compatible indeterminado, con infinitas soluciones dependientes de un parámetro. Geométricamente significa que la recta r está contenida en el plano π .

b) En este caso se tiene

$$r: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{1} \quad \text{y} \quad \pi: 3x - y - 2z - 5 = 0.$$

Como se sabe que la recta r es paralela al plano π , podemos calcular $d(r, \pi) = d(P, \pi)$ siendo P cualquier punto de la recta r . Podemos tomar entonces $P = (0, 3, 0)$ y aplicar directamente la fórmula de la distancia de un punto a un plano

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) = \frac{|3 \cdot 0 - 3 - 2 \cdot 0 - 5|}{\sqrt{9 + 1 + 4}} = \frac{|0 - 3 - 0 - 5|}{\sqrt{14}} = \frac{8}{\sqrt{14}}.$$

Otra forma de resolver este apartado es calcular el punto Q obtenido como la proyección ortogonal de $P = (0, 3, 0)$ sobre el plano $\pi: 3x - y - 2z - 5 = 0$ y utilizar que $d(r, \pi) = d(P, \pi) = d(P, Q)$. Para calcular Q , basta considerar la recta perpendicular a π que pasa por P y calcular Q como la intersección de esta recta con π . La recta perpendicular a π que pasa por P viene dada en coordenadas paramétrica por

$$\begin{cases} x = 0 + 3\lambda = 3\lambda \\ y = 3 - \lambda = 3 - \lambda \\ z = 0 - 2\lambda = -2\lambda \end{cases}$$

El punto $Q = (3\lambda, 3 - \lambda, -2\lambda)$ verifica entonces

$$9\lambda - 3 + \lambda + 4\lambda - 5 = 0 \iff 14\lambda - 8 = 0 \iff \lambda = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}.$$

Es decir,

$$Q = \left(\frac{12}{7}, \frac{17}{7}, \frac{-8}{7} \right),$$

$$\vec{PQ} = \vec{OQ} - \vec{OP} = \left(\frac{12}{7}, \frac{17}{7}, \frac{-8}{7} \right) - (0, 3, 0) = \left(\frac{12}{7}, \frac{-4}{7}, \frac{-8}{7} \right)$$

y

$$d(r, \pi) = |\vec{PQ}| = \sqrt{\frac{144}{49} + \frac{16}{49} + \frac{64}{49}} = \sqrt{\frac{224}{49}} = \sqrt{\frac{32}{7}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{8}{\sqrt{14}}.$$

c) El haz de planos paralelos al plano π es de la forma $3x - y - 2z = D$. Como debe contener a la recta r , basta con calcular D para que el plano pase por el punto $P = (0, 3, 0) \in r$. Por tanto

$$0 - 3 - 0 = D \iff D = -3 \implies \text{La solución es el plano } 3x - y - 2z = -3.$$

*Cuestiones 7 y 8. Estadística y Probabilidad (2,5 puntos cada una)***Cuestión 7.**

Dos urnas A y B contienen bolas de colores con la siguiente composición: La urna A contiene 3 bolas verdes, 3 bolas rojas y 4 bolas negras, y la urna B contiene 1 bola verde, 3 bolas rojas y 5 bolas negras. Se saca al azar una bola de la urna A y se mete en la urna B. A continuación, se saca al azar una bola de la urna B. Calcule:

- (0,5 p.) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra, sabiendo que la bola que se sacó de la urna A era verde.
- (1 p.) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra.
- (1 p.) La probabilidad de que la bola que se sacó de la urna A fuera verde, sabiendo que la bola que se ha sacado de la urna B ha sido negra.

Solución:

Solución: Observemos en primer lugar que la urna A tiene un total de 10 bolas, de las cuales 3 son verdes, 3 son rojas y 4 son negras. La urna B tiene un total de 9 bolas, de las cuales 1 es verde, 3 son rojas y 5 son negras.

Una vez que se ha sacado al azar una bola de la urna A y se ha metido en la urna B, la urna B contiene un total de 10 bolas, siendo su composición la siguiente:

Caso 1: La bola sacada de A ha sido verde: 2 verdes, 3 rojas y 5 negras;

Caso 2: La bola sacada de A ha sido roja: 1 verde, 4 rojas y 5 negras;

Caso 3: La bola sacada de A ha sido negra: 1 verde, 3 rojas y 6 negras.

a) Como la bola que se sacó de la urna A era verde, significa que estamos en el Caso 1 y la composición de la urna B, una vez que se ha pasado una bola verde de A a B, es la siguiente: 2 bolas verdes, 3 bolas rojas y 5 bolas negras. Por lo tanto, en este caso la probabilidad de que la bola que se saca de B sea negra es

$$\frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas negras en B}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en B}} = \frac{5}{10} = 0,5.$$

Observemos que en este caso estamos calculando de hecho una probabilidad condicionada, ya que se trata de

$$P(\text{Bola Negra/Caso 1}) = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas negras en B en el Caso 1}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en B}} = \frac{5}{10} = 0,5.$$

Esta observación no es estrictamente necesaria en este apartado pero sí lo será en los apartados siguientes.

b) En este apartado no sabemos de qué color es la bola que se ha pasado de A a B. Por lo tanto, y siguiendo la observación hecha en el apartado a), debemos utilizar el teorema de la probabilidad total para ver que

$$P(\text{Bola Negra}) = P(\text{Bola Negra/Caso 1}) \cdot P(\text{Caso 1}) + P(\text{Bola Negra/Caso 2}) \cdot P(\text{Caso 2}) + P(\text{Bola Negra/Caso 3}) \cdot P(\text{Caso 3}).$$

Pasamos a continuación a calcular cada una de estas probabilidades. Como el Caso 1 corresponde al caso en que la bola sacada de A es verde, se tiene

$$P(\text{Caso 1}) = P(\text{sacar Bola Verde de A}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas verdes en A}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en A}} = \frac{3}{10}.$$

Además, en este caso, se tiene

$$P(\text{Bola Negra/Caso 1}) = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas negras en B en el Caso 1}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en B}} = \frac{5}{10}.$$

Análogamente, como el Caso 2 corresponde al caso en que la bola sacada de A es roja, se tiene

$$P(\text{Caso 2}) = P(\text{sacar Bola Roja de A}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas rojas en A}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en A}} = \frac{3}{10}.$$

En este caso se tiene

$$P(\text{Bola Negra/Caso 2}) = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas negras en B en el Caso 2}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en B}} = \frac{5}{10}.$$

Finalmente, como el Caso 3 corresponde al caso en que la bola sacada de A es negra, se tiene

$$P(\text{Caso 3}) = P(\text{sacar Bola Negra de A}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas negras en A}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en A}} = \frac{4}{10}.$$

En este caso se tiene

$$P(\text{Bola Negra/Caso 3}) = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas negras en B en el Caso 3}}{\text{n}^{\circ} \text{ de bolas totales en B}} = \frac{6}{10}.$$

En conclusión,

$$P(\text{Bola Negra}) = \frac{5}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{5}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{15 + 15 + 24}{100} = \frac{54}{100} = 0,54.$$

c) Se trata también de una probabilidad condicionada pero en este caso nos están pidiendo $P(\text{Caso 1/Bola Negra})$. Por calcularla, observamos que

$$\begin{aligned} P(\text{Caso 1/Bola Negra}) &= \frac{P(\text{Caso 1} \cap \text{Bola Negra})}{P(\text{Bola Negra})} \\ &= \frac{P(\text{Bola Negra} \cap \text{Caso 1})}{P(\text{Bola Negra})} \\ &= \frac{P(\text{Bola Negra/Caso 1}) \cdot P(\text{Caso 1})}{P(\text{Bola Negra})} \\ &= \frac{\frac{5}{10} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{54}{100}} = \frac{15}{54} = \frac{5}{18} = 0,2778. \end{aligned}$$

Observación: Evidentemente, esta cuestión también se puede hacer por diagrama de árbol.

Cuestión 8.

En este ejercicio trabaje con 4 decimales para las probabilidades. Se lanza una moneda al aire 100 veces y se anota el resultado del lanzamiento, que puede ser cara o cruz con la misma probabilidad. Determine:

- (0,5 p.) Qué distribución sigue la variable aleatoria que cuenta el número de veces que sale cara.
- (0,5 p.) Calcule la media y la desviación típica de esta distribución.
- (0,5 p.) Cuál es la probabilidad de que salga cara 60 veces.
- (1 p.) Cuál es la probabilidad de que el número de veces que sale cara sea mayor o igual que 55.

Solución:

Solución: a) Llamamos X a la variable aleatoria que cuenta el número de veces que sale cara cuando se lanza una moneda al aire 100 veces.

La variable aleatoria X sigue una distribución binomial de parámetros $n = 100$, porque se lanza la moneda 100 veces, y $p = 0,5$, porque el resultado puede ser cara o cruz con la misma probabilidad.

b) La media de esta distribución es

$$\mu = n \cdot p = 100 \cdot 0,5 = 50$$

y su desviación típica es

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{100 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = \sqrt{25} = 5.$$

c) Se trata de calcular $P(X = 60)$. Utilizando la fórmula de las probabilidades puntuales de la binomial $B(n = 100, p = 0,5)$ se tiene que

$$P(X = 60) = \binom{100}{60} \cdot 0,5^{60} \cdot 0,5^{40} = \binom{100}{60} \cdot 0,5^{100}.$$

Si nuestra calculadora puede hacer este cálculo, basta con poner su valor numérico redondeando al cuarto decimal

$$P(X = 60) = \binom{100}{60} \cdot 0,5^{100} = 0,0108.$$

Como se trata de valores muy grandes de n , algunas calculadoras no son capaces de calcularlo a partir de la fórmula. Por eso, en este caso es necesario aproximar la distribución binomial $X = B(n = 100, p = 0,5)$ por una distribución normal $Y = N(\mu, \sigma)$ con $\mu = np = 50$ y $\sigma = \sqrt{npq} = 5$.

Comprobamos antes si dicha aproximación es fiable, para lo cual es suficiente con comprobar, por ejemplo, que n sea suficientemente grande, $n \geq 30$, y que $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, lo cual es cierto porque $np = nq = 50$. Otro criterio válido es que la n sea suficientemente grande, $n \geq 30$, y que $0,1 < p < 0,9$, lo cual también se cumple porque $n = 100$ y $p = 0,5$.

Por lo tanto, se puede aplicar la aproximación de la binomial por la normal. Teniendo en cuenta la corrección de continuidad (o corrección de Yates) y haciendo uso de la tipificación $Z = \frac{Y - 50}{5}$ sabemos entonces que $Z \sim N(0, 1)$ y se concluye que

$$\begin{aligned} P(X = 60) &\approx P(59,5 < Y < 60,5) = P\left(\frac{59,5 - 50}{5} < Y < \frac{60,5 - 50}{5}\right) \\ &= P(1,9 < Z < 2,1) = P(Z < 2,1) - P(Z < 1,9). \end{aligned}$$

Consultando en la tabla de $Z \sim N(0, 1)$ proporcionada, concluimos que

$$P(X = 60) \approx P(59,5 < Y < 60,5) = P(Z < 2,1) - P(Z < 1,9) = 0,9821 - 0,9713 = 0,0108.$$

d) Ahora se trata de calcular $P(X \geq 55)$. De nuevo, tenemos que hacerlo aproximando la binomial por la normal, que ya sabemos que es posible. En este caso, la corrección de continuidad nos dice que

$$\begin{aligned}P(X \geq 55) &\approx P(Y > 54,5) = P\left(Z > \frac{54,5 - 50}{5}\right) \\ &= P(Z > 0,9) = 1 - P(Z < 0,9),\end{aligned}$$

y, consultando en la tabla de $Z \sim N(0, 1)$ proporcionada, concluimos que

$$P(X \geq 55) \approx P(Y > 54,5) = 1 - P(Z < 0,9) = 1 - 0,8159 = 0,1841.$$

	EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) FASE GENERAL CURSO: 2022–2023 MATEMÁTICAS II	CONVOCATORIA: EXTRAORDINARIA
---	---	-------------------------------------



OBSERVACIONES IMPORTANTES: Se debe responder a un máximo de 4 cuestiones y no es necesario hacerlo en el mismo orden en que están enunciadas. Si se responde a más de 4 cuestiones, sólo se corregirán las 4 primeras, en el orden que haya respondido el estudiante. Solo se podrán usar las tablas estadísticas que se adjuntan. No se podrán usar calculadoras gráficas ni programables.

Tiempo máximo: 1 horas y 30 minutos.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Problema 1:

1: Se quiere calcular un número de tres cifras con los siguientes datos:

- i) La suma de sus tres cifras es 9.
 - ii) Si permutamos la cifra de las centenas con la cifra de las unidades, el número obtenido es el número inicial menos 99.
 - iii) Si permutamos la cifra de las decenas con la cifra de las unidades, el número obtenido es el número inicial más 36.
- a) **[1,5 p.]** Denotando por x la cifra de las centenas, por y la de las decenas y por z la de las unidades, plantee un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que represente la información dada en i), ii) y iii).
- b) **[1 p.]** Calcule el número en cuestión.

Problema 2:

2: Se dice que una matriz cuadrada A es 2-nilpotente si cumple que $A^2 = 0$.

- a) **[0,75 p.]** Justifique razonadamente que una matriz 2-nilpotente nunca puede ser regular (o invertible).
- b) **[0,75 p.]** Compruebe que la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ es 2-nilpotente.
- c) **[1 p.]** Determine para qué valores de a y b la matriz $A = \begin{pmatrix} 6 & a \\ 4 & b \end{pmatrix}$ es 2-nilpotente.

Problema 3:

3: Considere la función $f(x) = xe^{-x}$, definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$.

- a) **[0,75 p.]** Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- b) **[0,75 p.]** Calcule la derivada de $f(x)$ y determine los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento de la función $f(x)$ y sus extremos relativos (máximos y/o mínimos).
- c) **[1 p.]** Calcule la integral indefinida de la función $f(x)$.

Problema 4:

4: Considere la función $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x}$, definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$, donde $\cos^2 x = (\cos x)^2$.

- [1 p.] Calcule la integral indefinida de la función $f(x)$.
- [0,75 p.] Calcule la integral definida $\int_0^{\pi/2} f(x) dx$.
- [0,75 p.] Determine la primitiva de $f(x)$ que pasa por el punto $(\pi, 1)$.

Problema 5:

5: Los puntos $A = (6, -4, 4)$ y $B = (12, -1, 1)$ son dos vértices de un triángulo. El tercer vértice C es la proyección ortogonal del vértice A sobre la recta

$$r: \begin{cases} x - 2y = 5 \\ x + 2z = 5 \end{cases}$$

- [1,5 p.] Calcule las coordenadas del vértice C .
- [0,5 p.] Determine si el triángulo \widehat{ABC} tiene un ángulo recto en el vértice A .
- [0,5 p.] Calcule el área del triángulo \widehat{ABC} .

Problema 6:

6: Considere el plano π de ecuación $\pi: 2x + ay - 2z = -4$ y la recta r dada por

$$r: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2}.$$

- [1,25 p.] Estudie la posición relativa del plano π y de la recta r en función del parámetro a .

Se sabe que cuando $a = 1$ la recta r corta al plano π . Para ese valor de a :

- [0,75 p.] Calcule el punto de corte de la recta r y el plano π .
- [0,5 p.] Calcule el ángulo que forman.

Problema 7:

7: En un cine hay 3 salas y un total de 250 espectadores repartidos de la siguiente manera: 100 espectadores en la sala A, 50 en la sala B y 100 en la sala C. Se sabe que la película de la sala A gusta al 80% de los espectadores, la de la sala B al 20% de los espectadores y la de la sala C al 60% de los espectadores. A la salida de las tres películas se elige un espectador al azar. Calcule:

- [0,25 p.] La probabilidad de que el espectador haya estado en la sala C.
- [0,5 p.] La probabilidad de que le haya gustado la película, sabiendo que ha estado en la sala C.
- [0,5 p.] La probabilidad de que le haya gustado la película y haya estado en la sala C.
- [0,75 p.] La probabilidad de que le haya gustado la película.
- [0,5 p.] La probabilidad de que le haya gustado la película o haya estado en la sala C.

Problema 8:

8: En este ejercicio trabaje con 4 decimales para las probabilidades y 2 decimales para los porcentajes.

El peso de los recién nacidos en la Región de Murcia sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ desconocidas. Se sabe que el 67% de los recién nacidos pesan menos de 3,464 kg y que el 1,5% de los recién nacidos pesan más de 4,502 kg.

- a) **[0,5 p.]** ¿Cuál es el porcentaje de recién nacidos cuyo peso está comprendido entre 3,464 y 4,502 kg?
- b) **[1 p.]** Calcule la media y la desviación típica de esta distribución.
- c) **[1 p.]** Calcule el porcentaje de recién nacidos que pesan menos de 2,33 kg.

RESPUESTAS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Problema 1:

1: Se quiere calcular un número de tres cifras con los siguientes datos:

- i) La suma de sus tres cifras es 9.
 - ii) Si permutamos la cifra de las centenas con la cifra de las unidades, el número obtenido es el número inicial menos 99.
 - iii) Si permutamos la cifra de las decenas con la cifra de las unidades, el número obtenido es el número inicial más 36.
- a) [1,5 p.] Denotando por x la cifra de las centenas, por y la de las decenas y por z la de las unidades, plantee un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que represente la información dada en i), ii) y iii).
- b) [1 p.] Calcule el número en cuestión.

Solución:

a) El número es $xyz = 100x + 10y + z$.

“La suma de sus tres cifras es 9” $\rightarrow x + y + z = 9$

“Si permutamos la cifra de las centenas con la cifra de las unidades, el número obtenido es el número inicial menos 99” $\rightarrow zyx = xyz - 99 \Rightarrow 100z + 10y + x = 100x + 10y + z - 99$.

“Si permutamos la cifra de las decenas con la cifra de las unidades, el número obtenido es el número inicial más 36” $\rightarrow xzy = xyz + 36 \Rightarrow 100x + 10z + y = 100x + 10y + z + 36$

Reunimos todas las ecuaciones en un sistema:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 9 \\ 100z + 10y + x = 100x + 10y + z - 99 \\ 100x + 10z + y = 100x + 10y + z + 36 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y + z = 9 \\ 99z - 99x = -99 \\ -9y + 9z = 36 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y + z = 9 \\ z - x = -1 \\ -y + z = 4 \end{array} \right\}$$

b) Lo resolvemos.

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 9 \\ z - x = -1 \\ -y + z = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y + z = 9 \\ z = x - 1 \\ -y + z = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x + y + x - 1 = 9 \\ -y + x - 1 = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + y = 10 \\ -y + x = 5 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + y = 10 \\ x = 5 + y \end{array} \right\} \Rightarrow 2(5 + y) + y = 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10 + 2y + y = 10 \Rightarrow 3y = 0 \Rightarrow \boxed{y = 0} \Rightarrow \boxed{x = 5 + 0 = 5} \Rightarrow \boxed{z = 5 - 1 = 4}$$

El número es el 504.

Problema 2:

2: Se dice que una matriz cuadrada A es 2-nilpotente si cumple que $A^2 = 0$.

a) [0,75 p.] Justifique razonadamente que una matriz 2-nilpotente nunca puede ser regular (o invertible).

b) [0,75 p.] Compruebe que la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ es 2-nilpotente.

c) [1 p.] Determine para qué valores de a y b la matriz $A = \begin{pmatrix} 6 & a \\ 4 & b \end{pmatrix}$ es 2-nilpotente.

Solución:

a) Para que sea invertible su determinante debe ser no nulo.

$$|A^2| = |A \cdot A| = |A| \cdot |A| = |A|^2$$

$$\text{Como } A^2 = 0 \Rightarrow |A^2| = |0| = 0 \Rightarrow |A|^2 = 0 \Rightarrow |A| = 0$$

La matriz A no es invertible pues su determinante es nulo.

b)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9-9 & -27+27 \\ 3-3 & -9+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

La matriz A es 2-nilpotente.

c) Planteamos que $A^2 = 0$.

$$A^2 = 0 \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 6 & a \\ 4 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & a \\ 4 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36+4a & 6a+ab \\ 24+4b & 4a+b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 36+4a=0 \\ 6a+ab=0 \\ 24+4b=0 \\ 4a+b^2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a=-36 \rightarrow \boxed{a=-9} \\ 6a+ab=0 \\ 24+4b=0 \rightarrow 4b=-24 \rightarrow \boxed{b=-6} \\ 4a+b^2=0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6(-9)+(-9)(-6)=0 \\ 4(-9)+(-6)^2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -54+54=0 \\ -36+36=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{a=-9} \\ \boxed{b=-6} \end{cases}$$

Los valores buscados son $a = -9$ y $b = -6$.

Problema 3:

3: Considere la función $f(x) = xe^{-x}$, definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$.

- [0,75 p.]** Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- [0,75 p.]** Calcule la derivada de $f(x)$ y determine los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento de la función $f(x)$ y sus extremos relativos (máximos y/o mínimos).
- [1 p.]** Calcule la integral indefinida de la función $f(x)$.

Solución:

a)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \frac{\infty}{\infty} = \text{Indeterminación (L'Hôpital)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = \frac{1}{\infty} = \boxed{0} \end{aligned}$$

b) Usamos la derivada.

$$f'(x) = e^{-x} + x(-1)e^{-x} = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow (1-x)e^{-x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 1-x=0 \rightarrow x=1 \\ e^{-x}=0 \rightarrow \text{¡Imposible!} \end{cases}$$

Estudiamos el signo de la derivada antes y después de $x = 1$.

En el intervalo $(-\infty, 1)$ tomamos $x = 0$ y la derivada vale $f'(0) = (1-0)e^{-0} = 1 > 0$. La función crece en $(-\infty, 1)$.

En el intervalo $(1, +\infty)$ tomamos $x = 2$ y la derivada vale $f'(2) = (1-2)e^{-2} = \frac{-1}{e^2} < 0$. La función decrece en $(1, +\infty)$.

La función crece en $(-\infty, 1)$ y decrece en $(1, +\infty)$.

La función presenta un máximo relativo en $x = 1$.

c)

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int xe^{-x} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Integración por partes} \\ u = x \rightarrow du = dx \\ dv = e^{-x} dx \rightarrow v = \int e^{-x} dx = -e^{-x} \end{array} \right\} = \\ &= x(-e^{-x}) - \int -e^{-x} dx = -xe^{-x} + \int e^{-x} dx = \boxed{-xe^{-x} - e^{-x} + K} \end{aligned}$$

Problema 4:

4: Considere la función $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x}$, definida para todo valor de $x \in \mathbb{R}$, donde $\cos^2 x = (\cos x)^2$.

- a) [1 p.] Calcule la integral indefinida de la función $f(x)$.
- b) [0,75 p.] Calcule la integral definida $\int_0^{\pi/2} f(x) dx$.
- c) [0,75 p.] Determine la primitiva de $f(x)$ que pasa por el punto $(\pi, 1)$.

Solución:

a)

$$\int f(x) dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x} dx = \left\{ \begin{array}{l} \text{Cambio de variable} \\ \cos x = t \rightarrow -\operatorname{sen} x dx = dt \\ dx = \frac{1}{-\operatorname{sen} x} dt \end{array} \right\} = \int \frac{\cancel{\operatorname{sen} x}}{1+t^2} \frac{1}{-\cancel{\operatorname{sen} x}} dt =$$

$$= -\int \frac{1}{1+t^2} dt = -\operatorname{arctg} t = \boxed{-\operatorname{arctg}(\cos x) + K}$$

b)

$$\int_0^{\pi/2} f(x) dx = [-\operatorname{arctg}(\cos x)]_0^{\pi/2} = \left[-\operatorname{arctg}\left(\cos \frac{\pi}{2}\right) \right] - [-\operatorname{arctg}(\cos 0)] =$$

$$= -\operatorname{arctg}(0) + \operatorname{arctg}(1) = 0 + \frac{\pi}{4} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

c) Sabemos que la primitiva $F(x) = -\operatorname{arctg}(\cos x) + K$.Para hallar el valor de K hacemos que $F(\pi) = 1$.

$$\left. \begin{array}{l} F(x) = -\operatorname{arctg}(\cos x) + K \\ F(\pi) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow 1 = -\operatorname{arctg}(\cos \pi) + K \Rightarrow 1 = -\operatorname{arctg}(-1) + K \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 = -\left(-\frac{\pi}{4}\right) + K \Rightarrow K = 1 - \frac{\pi}{4} \Rightarrow \boxed{F(x) = -\operatorname{arctg}(\cos x) + 1 - \frac{\pi}{4}}$$

Problema 5:


5: Los puntos $A = (6, -4, 4)$ y $B = (12, -1, 1)$ son dos vértices de un triángulo. El tercer vértice C es la proyección ortogonal del vértice A sobre la recta

$$r: \begin{cases} x - 2y = 5 \\ x + 2z = 5 \end{cases}$$

- a) [1,5 p.] Calcule las coordenadas del vértice C .
 b) [0,5 p.] Determine si el triángulo \widehat{ABC} tiene un ángulo recto en el vértice A .
 c) [0,5 p.] Calcule el área del triángulo \widehat{ABC} .

Solución:

a) Hallamos la proyección ortogonal de A sobre la recta r .



Para ello hallamos el plano perpendicular a la recta que pasa por A . Dicho plano tiene como vector normal el vector director de la recta.

$$r: \begin{cases} x - 2y = 5 \\ x + 2z = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2y + 5 \\ x = 5 - 2z \end{cases} \Rightarrow 5 - 2z = 5 + 2y \Rightarrow -2z = 2y \Rightarrow y = -z \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r: \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_r(5, 0, 0) \\ \vec{u}_r = (-2, -1, 1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{cases} A(6, -4, 4) \in \pi \\ \vec{n} = \vec{u}_r = (-2, -1, 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(6, -4, 4) \in \pi \\ \pi: -2x - y + z + D = 0 \end{cases} \Rightarrow -12 + 4 + 4 + D = 0 \Rightarrow$$


$$\Rightarrow D = 4 \Rightarrow \pi: -2x - y + z + 4 = 0$$

El punto C es el punto de corte de la recta r y el plano π .

$$\left. \begin{array}{l} \pi: -2x - y + z + 4 = 0 \\ r: \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = -\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \end{array} \right\} \Rightarrow -2(5 - 2\lambda) - (-\lambda) + \lambda + 4 = 0 \Rightarrow -10 + 4\lambda + \lambda + \lambda + 4 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 6\lambda = 6 \Rightarrow \lambda = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = 5 - 2 = 3 \\ y = -1 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow C(3, -1, 1)$$

- b) Si el triángulo ABC tiene un ángulo recto en el vértice A significa que los vectores \overline{AB} y \overline{AC} son ortogonales, es decir, su producto escalar es nulo.



$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} = (12, -1, 1) - (6, -4, 4) = (6, 3, -3) \\ \overline{AC} = (3, -1, 1) - (6, -4, 4) = (-3, 3, -3) \end{array} \right\} \Rightarrow \overline{AB} \cdot \overline{AC} = (6, 3, -3) \cdot (-3, 3, -3) = -18 + 9 + 9 = 0$$

Se cumple y por tanto en el vértice A tenemos un ángulo de 90° .

- c) El área del triángulo ABC es la mitad del módulo del producto vectorial $\overline{AB} \times \overline{AC}$.

$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} = (6, 3, -3) \\ \overline{AC} = (-3, 3, -3) \end{array} \right\} \Rightarrow \overline{AB} \times \overline{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & 3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 27j + 27k = (0, 27, 27)$$

$$\text{Área } ABC = \frac{|\overline{AB} \times \overline{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{0^2 + 27^2 + 27^2}}{2} = \frac{27\sqrt{2}}{2} = 19.09 \text{ u}^2$$

OTRA FORMA DE HACERLO

Como ABC es un triángulo rectángulo el área es la base ($|\overline{AB}|$) por la altura ($|\overline{AC}|$) dividido entre 2.

$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} = (6, 3, -3) \\ \overline{AC} = (-3, 3, -3) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Área} = \frac{|\overline{AB}| \cdot |\overline{AC}|}{2} = \frac{\sqrt{6^2 + 3^2 + (-3)^2} \sqrt{(-3)^2 + 3^2 + (-3)^2}}{2} = \frac{27\sqrt{2}}{2}$$

Problema 6:

6: Considere el plano π de ecuación $\pi : 2x + ay - 2z = -4$ y la recta r dada por

$$r : \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2}.$$

a) **[1,25 p.]** Estudie la posición relativa del plano π y de la recta r en función del parámetro a .

Se sabe que cuando $a = 1$ la recta r corta al plano π . Para ese valor de a :

b) **[0,75 p.]** Calcule el punto de corte de la recta r y el plano π .

c) **[0,5 p.]** Calcule el ángulo que forman.

Solución:

- a) Determinamos el vector normal del plano y el director de la recta y obtenemos el valor de su producto escalar.

$$\pi: 2x + ay - 2z = -4 \Rightarrow \vec{n} = (2, a, -2)$$

$$r: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2} \Rightarrow r: \begin{cases} P_r(-1, -1, 5) \\ \vec{u}_r = (2, 1, -2) \end{cases}$$

$$\vec{n} \cdot \vec{u}_r = (2, a, -2) \cdot (2, 1, -2) = 4 + a + 4 = 8 + a$$

Este producto puede ser nulo o no, dando lugar a dos situaciones distintas que analizamos por separado.

- Si $a = -8$ el producto escalar es nulo y por tanto los vectores son ortogonales. En este caso recta y plano son paralelos o la recta está contenida en el plano. Comprobamos si el punto P_r de la recta está en el plano.

$$\left. \begin{array}{l} \pi: 2x - 8y - 2z = -4 \\ \text{¿} P_r(-1, -1, 5) \in \pi? \end{array} \right\} \Rightarrow \text{¿} -2 + 8 - 10 = -4? \rightarrow \text{¡Cierto!}$$

El punto de la recta está en el plano y por tanto la recta está contenida en el plano.

- Si $a \neq -8$ el producto escalar no es nulo y los vectores no son ortogonales, por lo que recta y plano son secantes, coinciden en un punto.

- b) Para $a = 1$ la recta r corta al plano π en un punto A.

$$r: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2} \Rightarrow r: \begin{cases} P_r(-1, -1, 5) \\ \vec{u}_r = (2, 1, -2) \end{cases} \Rightarrow r: \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = -1 + \lambda \\ z = 5 - 2\lambda \end{cases}$$


$$\left. \begin{array}{l} \pi: 2x + y - 2z = -4 \\ r: \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = -1 + \lambda \\ z = 5 - 2\lambda \end{cases} \end{array} \right\} \Rightarrow 2(-1 + 2\lambda) - 1 + \lambda - 2(5 - 2\lambda) = -4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -2 + 4\lambda - 1 + \lambda - 10 + 4\lambda = -4 \Rightarrow 9\lambda = 9 \Rightarrow \lambda = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -1 + 2 = 1 \\ y = -1 + 1 = 0 \\ z = 5 - 2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A(1, 0, 3)}$$

El punto de corte de recta y plano es el punto $A(1, 0, 3)$.

- c) El ángulo que forman plano y recta (α) lo determina el ángulo que forma el vector normal del plano y el vector director de la recta (β).



$$\left. \begin{array}{l} \pi: 2x + y - 2z = -4 \Rightarrow \vec{n} = (2, 1, -2) \\ r: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-5}{-2} \Rightarrow \vec{u}_r = (2, 1, -2) \end{array} \right\}$$

Como estos vectores son iguales entonces $\beta = 0$, significa que recta y plano son perpendiculares ($\alpha = 90^\circ$).


Recta y plano forman un ángulo de 90° .

Problema 7:

- 7: En un cine hay 3 salas y un total de 250 espectadores repartidos de la siguiente manera: 100 espectadores en la sala A, 50 en la sala B y 100 en la sala C. Se sabe que la película de la sala A gusta al 80% de los espectadores, la de la sala B al 20% de los espectadores y la de la sala C al 60% de los espectadores. A la salida de las tres películas se elige un espectador al azar. Calcule:
- a) **[0,25 p.]** La probabilidad de que el espectador haya estado en la sala C.
 - b) **[0,5 p.]** La probabilidad de que le haya gustado la película, sabiendo que ha estado en la sala C.
 - c) **[0,5 p.]** La probabilidad de que le haya gustado la película y haya estado en la sala C.
 - d) **[0,75 p.]** La probabilidad de que le haya gustado la película.
 - e) **[0,5 p.]** La probabilidad de que le haya gustado la película o haya estado en la sala C.

Solución:

Realizamos un diagrama de árbol para establecer las probabilidades de los distintos sucesos del experimento.



a) Este es un dato proporcionado en el ejercicio: $P(C) = \frac{100}{250} = \frac{2}{5} = 0.4$

b) Este es un dato proporcionado en el ejercicio: $P(G/C) = 0.60$

c) $P(C \cap G) = P(C)P(G/C) = 0.4 \cdot 0.6 = 0.24$

d) Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$\begin{aligned} P(G) &= P(A)P(G/A) + P(B)P(G/B) + P(C)P(G/C) = \\ &= 0.4 \cdot 0.8 + \frac{50}{250} \cdot 0.2 + 0.24 = 0.6 \end{aligned}$$

e) $P(G \cup C) = P(G) + P(C) - P(G \cap C) = 0.6 + 0.4 - 0.24 = 0.76$

Problema 8:

8: En este ejercicio trabaje con 4 decimales para las probabilidades y 2 decimales para los porcentajes.

El peso de los recién nacidos en la Región de Murcia sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ desconocidas. Se sabe que el 67% de los recién nacidos pesan menos de 3,464 kg y que el 1,5% de los recién nacidos pesan más de 4,502 kg.

- [0,5 p.]** ¿Cuál es el porcentaje de recién nacidos cuyo peso está comprendido entre 3,464 y 4,502 kg?
- [1 p.]** Calcule la media y la desviación típica de esta distribución.
- [1 p.]** Calcule el porcentaje de recién nacidos que pesan menos de 2,33 kg.

Solución:

X = El peso de los recién nacidos en la Región de Murcia.

$$X = N(\mu, \sigma)$$

a) Sabemos que $P(X \leq 3.464) = 0.67$ y que $P(X \geq 4.502) = 0.015$.

$$P(X \geq 4.502) = 0.015 \Rightarrow P(X \leq 4.502) = 1 - 0.015 = 0.985$$

Nos piden calcular $P(3.464 \leq X \leq 4.502)$.

$$P(3.464 \leq X \leq 4.502) = P(X \leq 4.502) - P(X \leq 3.464) = 0.985 - 0.67 = \boxed{0.315}$$

b) Sabemos que $P(X \leq 4.502) = 0.985$.

$$P(X \leq 4.502) = 0.985 \Rightarrow \{\text{Tipificamos}\} \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{4.502 - \mu}{\sigma}\right) = 0.985 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{4.502 - \mu}{\sigma} = 2.17 \Rightarrow 4.502 - \mu = 2.17\sigma \Rightarrow \boxed{4.502 - 2.17\sigma = \mu}$$

Sabemos que $P(X \leq 3.464) = 0.67$.

$$P(X \leq 3.464) = 0.67 \Rightarrow \{\text{Tipificamos}\} \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{3.464 - \mu}{\sigma}\right) = 0.67 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Miramos en la} \\ \text{tabla } N(0, 1) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{3.464 - \mu}{\sigma} = 0.44 \Rightarrow 3.464 - \mu = 0.44\sigma \Rightarrow \boxed{\mu = 3.464 - 0.44\sigma}$$

Reunimos las dos ecuaciones en un sistema y lo resolvemos.

$$\left. \begin{array}{l} \mu = 3.464 - 0.44\sigma \\ 4.502 - 2.17\sigma = \mu \end{array} \right\} \Rightarrow 4.502 - 2.17\sigma = 3.464 - 0.44\sigma \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4.502 - 3.464 = 2.17\sigma - 0.44\sigma \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1.038 = 1.73\sigma \Rightarrow \boxed{\sigma = \frac{1.038}{1.73} = 0.6} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\mu = 3.464 - 0.44 \cdot 0.6 = 3.2}$$

$$p(X < 2,33) = p(Z < (2,33 - 3,2)/0,6) = p(Z < -1,45) = p(Z > 1,45) = 1 - p(Z \leq 1,45) = 1 - 0,9265 = 0,0735$$

Es decir el 7.35 %